

Le genre *Phrixothrix* a quelques rapports avec *Cydistus* Bourg. (1); mais si ses élytres courts et ses antennes bilabellées l'en rapprochent, il s'en éloigne notablement par la forme du prothorax et du dernier article des antennes. Il ne renferme jusqu'à présent que trois espèces de l'Amérique méridionale : *hirtus* Ern. Oliv., *pullens* Berg, *uruguayensis* Berg.

Phrixothrix, nov. gen. (φριξόθριξ, hérissé). — ♂ *Palpi maxillares longitudine caput circiter aequantes, 4-articulati art. primo brevissimo secundo et tertio longitudine aequalibus, quarto longiore, securiformi, apice truncato. Mandibulae sat longiores, curvatae, acutae. Antennae 12-articulatae, setosae, articulis tribus primis simplicibus, 4-11 bilabellatis, art. ultimo filiformi, simplici. Oculi prominentes, integri. Elytra abbreviata, dehiscentes; alae integrae. Tarsi 5-articulati, unguiculis simplicibus. Abdomen segmentis septem, anali sat amplo.* — ♀ ignota.

Phrixothrix hirtus, n. sp. — *Elongatus, subparallelus, flavus, setis flavis undique hirsutus; capite piceo, sparsim profunde punctato; antennis flavis, setosis, 12-articulatis; articulo primo cylindrico, secundo et tertio transversis primo simul non longioribus, quarto-undecimo a basi utrinque, lamellam articulo ipso multo longiorem emittentibus; duodecimo simplice, elongato, filiformi, apice leviter incrussato; prothorace transverso, nitido, tenuissime sparsim punctato, lateribus arcuatis, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; scutello parvo, triangulati; elytris, abdominis segmentum tertium vix ultra prolongatis, dehiscentibus, apicem versus attenuatis, tenue punctatis, obsolete bicostulatis; subtus nitidus tarsis piceis.* — Long. : 48 mill.

Paraguay (ma collection).

Silidius et Silis exotiques nouveaux [COL. MALACODERMATA]

par Maurice PIC.

Silidius Pouilloni, n. sp. — ♂. *Satis latus, nitidus, niger, elytris testaceis apice late nigris; thorace transverso, postice impresso, lateraliter sinuato et postice appendiculato; antennis validis.* — Long. : 8 mill. — Africa occidentalis.

(1) *Annales de la Société entomologique de France* [1885], p. 272, tab. 5, fig. 5.,

Assez large, brillant, entièrement noir, sauf les élytres testacés sur leurs deux tiers antérieurs. Tête grosse, de la largeur du prothorax; antennes noires, robustes. Prothorax court et transversal, sinué sur les côtés et en arrière, subarqué en avant, relevé sur son pourtour, fortement impressionné en arrière sur le disque, faiblement échancré et appendiculé sur les côtés postérieurement. Écusson noir, triangulaire. Élytres peu plus larges que le prothorax, modérément longs, testacés antérieurement et largement noirs à leur extrémité, sans côtes, assez fortement ponctués. Pattes noires, assez robustes. Dessous du corps foncé. — Dahomey (reçu de POUILLON).

Diffère de *S. deustus* Reiche, qui est de coloration analogue, par le prothorax transversal, plus large comparé aux élytres, l'abdomen foncé, etc.

Très distinct, d'autre part, de *S. Sjöstedti* Bourg. près duquel on peut le placer, par la coloration, la forme moins allongée, etc.

Silis mexicana, n. sp. — *Elongata, subnitida, nigra, capite pro parte et thorace lateribus pallidis; thorace transverso, lateraliter et postice modice inciso; antennis satis elongatis, apice attenuatis.* — Long. : 6 mill. — America centralis.

Allongé, peu brillant, noir; tête en partie flave et bords latéraux du prothorax de cette dernière coloration. Tête grosse, flave en avant et en dessous, noire entre les yeux et sur le vertex; antennes noires, assez longues, un peu épaisses à la base, atténuées à l'extrémité. Prothorax transversal, noir sur le disque, flave sur les côtés, presque droit postérieurement et subarqué antérieurement, faiblement échancré sur ses côtés en arrière. Écusson noir, petit. Élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, un peu élargis vers leur milieu, à ponctuation ruguleuse dense et ornés de poils foncés en partie redressés, noirs avec le calus huméral vaguement jaunâtre. Pattes foncées, grêles. Dessous du corps foncé. — Mexique (coll. PIC).

A placer près de *S. praeorsa* Gorh.; en diffère par le prothorax peu incisé latéralement et la tête plus largement noire.

Silis subimpressa, n. sp. — ♂. *Satis lata et brevis, nitida, pro parte testacea, pro parte nigra, capite antice, thorace, pedibus antennisque ad basin testaceis, elytris nigris, lateraliter pallido limbatis, griseo pubescentibus; thorace transverso, in disco subimpresso, lateraliter postice longe lobato et dentato; antennis validis, apice attenuatis.* — Long. : 4-5 mill. — America meridionalis.

Assez large et court, brillant avec les élytres pubescents de gris, en partie testacé, en partie noir, devant de la tête, prothorax, base des

antennes, pattes et abdomen en partie testacés, élytres noirs avec une étroite bordure latérale pâle. Tête large, testacée mais obscurcie entre les yeux postérieurement; antennes noires, testacées à la base, épaisses, atténuées à l'extrémité. Prothorax testacé, transversal, presque de la largeur des élytres, marqué sur le disque en arrière d'une faible dépression, muni postérieurement, de chaque côté, d'une longue dent et d'un lobe long, bidenté à l'extrémité. Écusson foncé, subtriangulaire. Élytres relativement courts et larges, modérément ponctués, distinctement pubescents de gris, noirs avec une étroite bordure latérale flave. Pattes assez grêles, testacées avec parfois les tarsi obscurcis. Dessous du corps foncé avec l'abdomen en partie testacé. — Guyane Française : rivière Koura (LE MOULT in coll. PIC).

Peut se placer près de *Lemoulti* PIC dont il se distingue facilement par la forme moins robuste, la coloration des élytres, le prothorax de forme très différente et à faible dépression discale.

Silis maxima, n. sp. — *Elongata, nitida, testacea, capite, antennis pedibusque pro majore parte nigris thorace transverso, lateraliter sinuato et subtransverso, antice distincte attenuato et valde arcuato, postice et lateraliter longe bilobato et dentato* ♂; *antennis gracilibus*. — Long. 12 mill. — America meridionalis.

Par sa grande taille et sa coloration, cette espèce, qui ressemble à notre *Rhagonycha rufescens* Latr. avec bien entendu le prothorax tout autre et les membres foncés, est des plus distinctes, il est donc inutile de la décrire longuement; on peut la placer près de *S. plateroides* Gorb. J'en possède un couple venant de Callanga (Pérou).

Description d'un *Coryphium* nouveau de France

[COL. STAPHYLINIDAE]

par J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Coryphium Chobauti, n. sp. — *C. obscure ferrugineum vel castaneum, abdomine saepius paulo magis infuscato. A C. angusticollis, cui affine, corpore robustiore, capite multo latiore, antennis multo longioribus, oculis minoribus elytrisque multo brevioribus ac profundius punctatis optime distinguendum*. — Long. : 3-3,5 mill.

L'insecte est entièrement d'un brun châtain ou ferrugineux, un peu